

Protocolos para la posible detección del Gusano Barrenador del Nuevo Mundo en el Ganado

Guía para Productores Ganaderos

Los Gusanos Barrenadores del Nuevo Mundo (GBNM) son larvas o gusanos de la mosca del GBNM (*Cochliomyia hominivorax*) que causan la dolorosa afección de la miasis por el GBNM. Se provee esta guía a los productores ganaderos con fines de proveer información general e instrucciones relacionadas con el GBNM en el ganado de Texas.

Conozca la plaga

Las moscas del gusano barrenador (GBNM) se sienten atraídas por el olor, el suero y la sangre de las heridas en mamíferos y aves vivos de sangre caliente. Una vez que localizan a un huésped, las moscas depositan sus huevos en una abertura. Tras la eclosión de los huevos, las larvas se introducen o "atornillan" en el tejido vivo, alimentándose a medida que avanzan. El daño provocado por el desgarro del tejido profundiza la herida, mientras que más larvas continúan eclosionando y alimentándose. Esto puede derivar en una miasis por el GBNM, una coinfección con otras especies e infecciones, ocasionando daños graves y, en ocasiones, mortales.

Monitoree el ganado

- Revise el ganado en busca de indicios de infestaciones por el GBNM, incluyendo moscas, gusanos, larvas o huevos.
- Revise los orificios corporales— tales como la nariz, las orejas, el ombligo o los genitales— en busca de secreciones o inflamación.
- Observe a los animales para detectar signos clínicos de miasis por el GBNM e infecciones secundarias.


Reporte las sospechas

Llame de inmediato a un funcionario de sanidad animal si sospecha que los GBNM han afectado a su ganado.

8:00 AM - 5:00 PM, contacte a una oficina regional local de TAHC:

Amarillo.....	806-641-7000
Pleasanton.....	361-358-3234
Giddings.....	979-212-5440
Laredo.....	956-568-5741
Stephenville.....	512-556-6277
Sulphur Springs.....	903-919-3748

5:00 PM - 8:00 AM y en fines de semana, contacte la sede de TAHC:
Veterinario en turno.....1-800-550-8242



Prevenga la propagación adicional

- Monitoree a los animales con regularidad para detectar signos de moscas del GBNM, miasis por el GBNM o infecciones secundarias.
- Asegúrese de inspeccionar a las mascotas y los vehículos en busca de moscas del GBNM antes de viajar, especialmente en zonas infestadas por GBNM. Si un animal presenta una infestación, no debe ser trasladado.
- Mantenga las heridas abiertas limpias y cubiertas.
- Trate la ropa, el equipo y a las personas con repelentes adecuados.

